

Calendario de vacunación infantil

¿Tu familia se agranda?

Para proteger a su bebé de la tosferina y la gripe, las personas embarazadas deben recibir la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap, por su sigla en inglés) entre las semanas 27 y 36 y la vacuna antigripal en cualquier momento del embarazo.

NACIMIENTO

Nacimiento

- Hepatitis B, 1.ª dosis

1-2 MESES

1-2 meses

- Hepatitis B, 2.ª dosis
- Tétanos, difteria y tosferina (DTaP, por su sigla en inglés), 1.ª dosis
- Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 1.ª dosis
- Polio, 1.ª dosis
- Neumonía, 1.ª dosis
- Rotavirus, 1.ª dosis

4 MESES

4 meses

- Tétanos, difteria y tosferina (DTaP), 2.ª dosis
- Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 2.ª dosis
- Polio, 2.ª dosis
- Neumonía, 2.ª dosis
- Rotavirus, 2.ª dosis

6 MESES

6 meses

- Gripe (según la época del año), 1.ª dosis
- Neumonía, 3.ª dosis
- Tétanos, difteria y tosferina (DTaP), 3.ª dosis
- Rotavirus (según el fabricante), 3.ª dosis
- Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 3.ª dosis (según el fabricante)

12 MESES

12-15 meses

- Haemophilus influenzae de tipo b (Hib), 4.ª dosis (según el fabricante)
- Sarampión, rubéola y parotiditis (MMR, por su sigla en inglés), 1.ª dosis
- Neumonía, 4.ª dosis
- Varicela, 1.ª dosis

15 MESES

15-18 meses

- Tétanos, difteria y tosferina (DTaP), 4.ª dosis

18 MESES

Entre 6 y 18 meses

- Hepatitis B, 3.ª dosis
- Polio, 3.ª dosis
- Segunda dosis de la vacuna antigripal

Entre 12 y 23 meses

- Hepatitis A (2 dosis con 6 meses de diferencia)

VACUNA ANTIGRIPAL

Los CDC recomiendan que los niños, a partir de los 6 meses de edad, reciban la vacuna antigripal todos los años.

Los niños de 2 años y mayores podrían recibir la vacuna por nebulización en lugar de ser inyectados.

Los niños menores de 9 años que no hayan recibido la vacuna anteriormente deben recibir dos dosis con cuatro semanas de diferencia.

VACUNA ANTI-COVID-19

Todas las personas que cumplan las condiciones (incluidos los niños) deben recibir las dosis recomendadas de la vacuna anti-COVID-19.

4-6 AÑOS

4-6 años

- Tétanos, difteria y tosferina (DTaP), 5.ª dosis
- Sarampión, rubéola y parotiditis (MMR, por su sigla en inglés), 2.ª dosis
- Polio, 4.ª dosis
- Varicela, 2.ª dosis

11-12 AÑOS

11-12 años

- Tétanos, difteria y tosferina (Tdap), 1.ª dosis
- Virus del papiloma humano (HPV, por su sigla en inglés), 1.ª y 2.ª dosis
- Meningitis ACWY, 1.ª dosis

16-18 AÑOS

16-18 años

- Meningitis ACWY, 2.ª dosis
- Meningitis B (2 o 3 dosis, según el fabricante)